

Nazwa scenariusza	NAKLUCIE LĘDŹWIOWE
Cele	<p>Cel główny: rola pielęgniarki podczas pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego.</p> <p>Cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przygotowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego, — asystowanie do nakłucia lędźwiowego w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego.
Opis scenariusza	<p>Symulator osoby dorosłej obrany w piżamę, leży na łóżku w gabinecie zabiegowym. Przygotuj zestaw do nakłucia lędźwiowego oraz asystuj podczas pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego.</p>
Wyposażenie/ wykaz sprzętu dla technika do przygotowania	<ul style="list-style-type: none"> — symulator osoby dorosłej — wózek zabiegowy — rękawiczki jałowe — chusta jałowa — jałowe gaziki 7,5x7,5 cm — jałowa pęseta — igły do nakłucia lędźwiowego — octenisept bezbarwny i octenisept barwiony — środek do znieczulenia skóry np. 1 amp. 2% lignocaina — próbówki do pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego — miska nerkowata — pojemnik twardościenny — strzykawki 2ml, igły 0,7 — worek czerwony na odpady skażone — rękawiczki niejałowe — karta wykonania zabiegu — jałowy plaster z opatrunkiem 10xcm — środek do dezynfekcji rąk
Informacje dla uczestników	<p>Na oddziale neurologicznym znajduje się 42-letni pacjent, Pan Krzysztof z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych. Lekarz zlecił pobranie płynu mózgowo rdzeniowego. Przygotuj pacjenta do badania, przygotuj zestaw i asystuj do pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego.</p>
Parametry wstępne	<p>Pacjent przytomny Drogi oddechowe drożne 27 oddechów/min; niemierny głęboki, przyspieszony; SpO₂ – 97% Temp. 36,8°C Poziom glikemii: 80mg% (na czczo) HR: 80/min RR: 138/87mmHg</p>
Wywiad medyczny	<p>Na oddziale neurologicznym znajduje się 42-letni pacjent, Pan Krzysztof z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych.</p>

<p>Przebieg scenariusza</p>	<p>Kolejność wykonywanych czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etap przygotowawczy: <ul style="list-style-type: none"> — Mycie i dezynfekcja rąk — skompletowanie zestawu jałowego — dezynfekcja rąk i założenie rękawiczek jednorazowych — przygotowanie pacjenta, komunikacja z pacjentem, ułożenie pacjenta — podanie lekarzowi jałowych rękawic 2. Etap wykonania: <ul style="list-style-type: none"> — podanie lekarzowi jałowej serwety a następnie jałowego sprzętu — polanie gazików octeniseptem (najpierw bezbarwnym 2 razy, trzeci raz barwionym) — podanie lekarzowi 1% roztworu lignocainy — podstawienie probówek do pobrania materiału do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki — założenie podanie opatrunku jałowego 3. Etap porządkowania: <ul style="list-style-type: none"> — zdjęcie jednorazowych rękawic, mycie i dezynfekcja rąk — przewiezienie pacjenta na salę chorych — opisanie probówek z płynem mózgowo-rdzeniowym — uporządkowanie sprzętu, segregacja odpadów medycznych — dezynfekcja rąk — udokumentowanie zabiegu — poinstruowanie pacjenta o postępowaniu po zabiegu <p>Czas wykonania zadania: 10 min. Checklista przekazana studentom.</p>
<p>Kwestie do omówienia</p>	<ul style="list-style-type: none"> — znaczenie właściwego przygotowania pacjenta — znaczenie właściwego przygotowania zestawu — omówienie tzw. punktów krytycznych — potencjalne źródła błędów