

Nazwa scenariusza	Kangurowanie.
Cele	Nabywanie umiejętności do: <ul style="list-style-type: none"> • przygotowania pomieszczenia, matki i noworodka do kangurowania; • obserwacji noworodka w trakcie kangurowania;
Opis scenariusza	W oddziale patologii noworodka przebywa trzydniowy wcześniak Doran „s” Jolanty, urodzony w 33/3, wagi 1940g, oceniony na 4/5/6/8 pkt w Apgar. Obecnie na oddechu własnym, z tlenoterapią bierną 23 %. Parametry ogólne w normie.
Wypożyczenie/ wykaz sprzętu dla technika do przygotowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wypożyczenie sali w oddziale noworodkowym: <ul style="list-style-type: none"> • stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk, • kosze na śmieci, w tym z czerwonym workiem na odpady niebezpieczne, • inkubator zamknięty • monitor/pulsoksymetr, • fotel do kangurowania, • pompa infuzyjna, • parawan, 2. Sprzęt drobny: <ul style="list-style-type: none"> • czujnik do monitora, • rękawiczki lateksowe, niejałowe, • dren do tlenu, z maseczką; • strzykawka 50 ml i dren – łącznik do kroplówki, 3. Sprzęt: <ul style="list-style-type: none"> • fantom wcześniaka, z opaskami identyfikacyjnymi, z założoną sondą dożołądkową i przymocowanym drenem z kroplówki; • fantom pielęgnacyjny kobiety (względnie hybryda kobieta z założonym fantomem piersi pod koszulą) z opaskami identyfikacyjnymi, w szerokiej koszuli nocnej, • pampers, prześcieradło, pieluszka, „maciczka”, kocyk • karta obserwacji noworodka,
Informacje dla technika jak rozstawić sprzęt (rysunek)	<ol style="list-style-type: none"> 1. w inkubatorze leży fantom noworodka: <ul style="list-style-type: none"> • na prześcieradku, „macicze”, w pampersie, • z założonym czujnikiem saturacji i tętna, • z opaskami identyfikacyjnymi, • z podłączonym wenflonem, kroplówką, 2. obok inkubatora stoi: <ul style="list-style-type: none"> • pompa infuzyjna ze strzykawką 50 ml • fotel do kangurowania z fantomem kobiety, • parawan, 3. na blacie/wózku zabiegowym znajduje się: <ul style="list-style-type: none"> • pudełko rękawiczek, • karta obserwacji noworodka.
Przebieg scenariusza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie stanu ogólnego dziecka, parametrów. 2. Przygotowanie pomieszczenia (zamknięcie drzwi, okien, zabezpieczenie przed hałasem, nadmiernym oświetleniem, stworzenie warunków intymności); 3. W związku z tlenoterapią bierną – podłączenie drenu, maseczki do zewnętrznego źródła tlenu. 4. Higieniczne mycie i/lub dezynfekcja rąk. 5. Sprawdzenie tożsamości dziecka i mamy. 6. Poproszenie mamy o przyjęcie pozycji w fotelu półleżącej oraz zdjęcie

	<p>biustonosza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sprawdzenie przebiegu (ewentualne ich „uwolnienie”) drenów, kabli od czujnika. 8. Sprawne uchwycenie wcześniaka, (z asekuracją głowy, stabilizacją stawów biodrowych, bokiem od podłoża, z zabezpieczeniem wszystkich drenów) i wyjęcie go z inkubatora. 9. Ułożenie noworodka na klatce piersiowej mamy, w stabilnej pozycji – „skóra do skóry”, „brzuch do brzucha” i sprawdzenie położenia wszystkich kabli i drenów. 10. Kontrola parametrów życiowych, zabarwienia powłok skórnych, oddechów noworodka. 11. Okrycie noworodka pieluszką i kocem. 12. Zabezpieczenie w bliskiej odległości drenu z tlenem. 13. Upewnienie się, że mamie i dziecku jest wygodnie. 14. Higieniczne umycie i/lub zdezynfekowanie rąk. 15. Udokumentowanie wykonania zabiegu.
Informacja dla studenta	<p>Zalety kangurowania dla dziecka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mniejszy stres, uspokojenie, wyciszenie, • pozytywna stymulacja zmysłów(węch, słuch, dotyk), • korzystny wpływ na krążenie, oddychanie (mniejsze zapotrzebowanie na tlen w trakcie zabiegu), układ nerwowy, pokarmowy (mniej kolek), • lepszy sen dziecka, <p>Zalety kangurowania dla mamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyspiesza inwolucje mięśnia macicy, zmniejsza krwawienie, • rozwija laktację, • zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji poporodowej. <p>W oddziale patologii noworodka przebywa trzydniowy wcześniak Doran „s” Jolanty, urodzony w 33/3, wagi 1940g, oceniony na 4/5/6/8 pkt w Apgar.</p> <p>Obecnie na oddechu własnym, z tlenoterapią bierną 23 %. Parametry ogólne w normie. Proszę przygotować noworodka, mamę i otoczenie do kangurowania a następnie wykonać je zgodnie z zasadami.</p>
Kwestie do omówienia (Podsumowanie po ćwiczeniu)	<ul style="list-style-type: none"> • czas kangurowania; • zabiegi podczas kangurowania; • kangurujący ojciec; • kangurowanie bliźniąt;